

Les effets secondaires principaux des traitements anti-hormonaux (hormonothérapie)

| | Tamoxifène | Antiaromatases |
|--|--|---|
| Indication | Cancer du sein avec récepteurs aux hormones positifs <ul style="list-style-type: none"> - Adjuvant - Néo-adjuvant - En cas de rechute de la maladie | Cancer du sein avec récepteurs aux hormones positifs chez la femme en ménopause avérée <ul style="list-style-type: none"> - Adjuvant (Arimidex®, Femara®, Aromasine®) - Néo-adjuvant - En cas de rechute de la maladie |
| Posologie | 1 comprimé à 20 mg par jour | 1 comprimé par jour |
| Recommandations | <ul style="list-style-type: none"> - Examen gynécologique obligatoire avant traitement, surveillance gynécologique annuelle ensuite également - Echo pelvienne en surveillance : optionnelle - Contraception efficace en cours, non hormonale, chez les femmes non ménopausée - Surveillance des tests hépatiques recommandée | <ul style="list-style-type: none"> - Ménopause certaine - Ostéodensitométrie de référence puis à surveiller tous les deux ans - Dosage du Cholestérol |
| Contre-indications majeures | <ul style="list-style-type: none"> - Grossesse et allaitement - Hypersensibilité - Galactosémie congénitale | <ul style="list-style-type: none"> - Hypersensibilité - Grossesse et allaitement |
| Contre-indications relatives | <ul style="list-style-type: none"> - Hyperplasie endométriale pré-existante - Antécédent de thrombose profonde ou embolie pulmonaire - Rétinopathies, cataractes | <ul style="list-style-type: none"> - Antécédents thrombo-emboliques : indication à mesurer |
| Effets secondaires les plus fréquents | <ul style="list-style-type: none"> - Anomalies bénignes de l'endomètre (partie interne de l'utérus) (atrophie, hypertrophie) avec risque très faible mais réel de cancer de l'endomètre : en cas de pertes de sang en dehors des règles, une consultation gynécologique s'impose ainsi qu'une hystérocopie - Bouffées de chaleur - Prurit vulvaire, pertes blanches ou sécheresse vaginale - Nausées rares, maux de tête | <ul style="list-style-type: none"> - Douleurs musculaires et articulaires très fréquentes avec dérouillage matinal ou après immobilité - Bouffées de chaleur, - Sécheresse vaginale - Troubles digestifs rares à type de nausées ou maux de ventre |

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Disparition des règles ou cycles irréguliers chez les femmes non ménopausées. Une contraception mécanique efficace est indispensable car la tamoxifène est inducteur d'ovulation et par ailleurs tératogène (risque de malformations en cas de grossesse sous ce traitement)- Cataractes, modifications cornéennes, rétinopathies (rares)- Prise de poids assez fréquente- Anomalies hémato et tests hépatiques rares- Thrombose profondes (phlébites) et embolies pulmonaires : en cas d'intervention chirurgicale, d'immobilisation, voire de long voyage, une anti-coagulation préventive et/ou l'arrêt très transitoire du médicament peuvent être recommandés. En parler avec votre médecin. | <ul style="list-style-type: none">- Modifications des enzymes hépatiques sur la prise de sang- élévation du cholestérol (contrôle régulier annuel du cholestérol recommandé)- Risque de déminéralisation osseuse et ostéoporose- Eruptions cutanées très rares en début de traitement- Thrombophlébites (très rares)- Exacerbation d'un syndrome du canal carpien- Insomnies- Pertes de mémoire |
|--|---|---|